

О мерах предосторожности до, во время и после аэрозольной дезинфекции

Заказчик с перечнем по применению дез средств, материалам ознакомлен, подтверждает отсутствие каких - либо аллергическими заболеваниями и с повышенной чувствительностью к хлору у рабочего персонала.

Заказчик обеспечивает беспрепятственный и безопасный доступ Исполнителя ко всем площадям, подлежащим обработке, на необходимое для обработки время, обеспечить безопасность работающего персонала Исполнителя.

Заказчик по требованию Исполнителя и при наличии в этом необходимости, предоставлять мелкий хозяйственный инвентарь, горячую воду, рабочую силу.

Заказчик производит обесточивание электроэнергии и пожарной сигнализации перед обработкой
Заказчик проводит своими силами изоляцию вытяжных отверстий (полиэтиленовыми мешками, пленкой и т. д.)

Заказчик отмечает места установки камер видеонаблюдения любыми опознавательными наклейками

Обработку помещений проводят в отсутствие людей, домашних животных, птиц и рыб, при открытых окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть продукцию, которая может адсорбировать препарат.

После окончания дезинфекции в помещении следует сделать влажную уборку, помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью. Все работы со средством и его рабочими растворами следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

Работы со всеми рекомендованными рабочими растворами средства способом орошения и с рабочими растворами от 0,1% концентрации и выше следует проводить с защитой органов дыхания, а глаз - герметичными очками.

Уборку проводят в марлевой повязке, перчатках, с использованием мыльно-содового раствора (30-50 г кальцинированной соды на 1 л воды).

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

При нарушении мер предосторожности возможно появление раздражения верхних дыхательных путей. Пострадавшего следует вывести из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение; рот и носоглотку прополоскать водой, дать теплое питье (молоко или "Боржоми").

При попадании средства на кожу его следует смыть водой с мылом. При попадании средства в глаза их следует промыть под проточной водой, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и обратиться к окулисту. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

ДАТА	
Исполнитель ООО Альфадез	Заказчик, должность
ФИО	ФИО